

MENTOR

*Soja précoce
milieu à fin de groupe 00*

L'essentiel

*Très haute productivité
alliée à une bonne
rusticité*

*Très haute teneur
en protéines*

*LA référence
dans le groupe 00
en Europe,
témoin Terres Inovia*



caussadesemencespro

MENTOR

Soja précoce milieu à fin de groupe 00



Profil variétal

Inscription CTPS France 2009
Groupe 00 : Milieu à fin de groupe
Débouché : Alimentation animale et humaine
Croissance : Semi-déterminée
Couleur de gousse : Brune foncé
Couleur du hile : Jaune
Terminaison foliaire : Pointue ovale
Couleur floraison : Violette
Teneur en protéines : Élevée
Rendement protéines : Très élevé
Teneur en huile : Moyenne

Profil agronomique

	M/B	Vigueur au départ
	Courte	Hauteur plante
	Assez haute	Hauteur 1 ^{ère} gousse
	PS	Sensibilité verse
	PS	Sensibilité Sclérotinia
	Élevé	PMG
Sélectivité Herbicides		
	MS/PS	Sélectivité Pendiméthaline
	MS/PS	Sélectivité Métobromuron
	AS	Sélectivité Métribuzine

AS : Assez Sensible – S : Sensible – MS : Moyennement Sensible

PS : Peu Sensible - TPS : Très Peu Sensible

Sources : CTPS/GEVES/ARVALIS Institut du végétal/R&D CAUSSADE SEMENCES PRO

L'essentiel

Très haute productivité alliée à une bonne rusticité.

LA référence dans le groupe 00 en Europe, témoin Terres Inovia.

Très haute teneur en protéines.

Peut convenir pour des débouchés alimentation humaine.

Résultats essais France

Variété	Rendement pluriannuel (q)				Teneur en protéines (%)	Rendement protéines (%)	PMG	Hauteur plante (cm)	Hauteur 1 ^{ère} gousse (cm)
	2018	2019	2020	Moyenne					
MENTOR	44,16	42,3	36,7	41,1	42,1	17,3	205,3	73,5	11,6
%/moyenne	104,2	106,2	101,7	104,1		109,3			
Points/moyenne					+2		+10,6	-10,1	+0,2
Moyenne	42,4	39,8	36,1	39,4	40,1	15,8	194,7	83,6	11,4
Nombre de références	18	24	31	73	106	72	77	73	66


Source : Base de données CAUSSADE SEMENCES PRO

Préconisations

Conseils de semis : privilégier un semoir monograinne à 2 ou 3 cm de profondeur semer dans un sol réchauffé (>10°C), ressuyé. S'assurer que les températures soient supérieures à 10°C les jours suivant le semis. Penser à adapter les préconisations pour des semis tardifs, en dérobé ou en culture biologique.

Écartement entre rangs : privilégier un écartement de 18 à 50 cm.

• Zone de culture



■ culture principale
■ culture dérobée ou semis tardifs
Source : Terres Inovia

• Densité de semis

Conduite	Obj. peuplement (pieds / ha)	Densité semis (graines / ha)
Sec ou conditions stressantes	550 000	610-690 000
Irrigué ou bonnes conditions	450 000	500-600 000